

3^e ÉDITION

KiIT

POUR LES
COMMOTIONS
CÉRÉBRALES

Comprendre et prendre en charge les commotions cérébrales chez les jeunes



Hôpital de Montréal
pour enfants

Centre universitaire
de santé McGill



Montreal Children's
Hospital

McGill University
Health Centre

TRAUMATOLOGIE TRAUMA



Nous remercions
Andy Collins pour les enfants
pour son généreux parrainage
de cette publication.

L'information contenue dans le KiT est basée sur l'expertise et l'expérience clinique du Centre de traumatologie de l'Hôpital de Montréal pour enfants du Centre universitaire de santé McGill.

Cette information est conforme aux données les plus à jour de la recherche actuelle sur le sujet.

**[hopitalpourenfants.com/
les-commotions-cerebrales](http://hopitalpourenfants.com/les-commotions-cerebrales)**

Table des matières

Note des éditeurs	3
Éditeurs et contributeurs	4
Qu'est-ce qu'une commotion cérébrale	7
Reconnaître une commotion cérébrale	9
Prendre en charge une commotion cérébrale	11
À quoi s'attendre après une commotion cérébrale	12
Plan général de gestion des activités	14-18
Plan de retour à l'apprentissage scolaire	20-29
Plan de retour aux activités physiques et aux sports	31-33
Conseils de prévention	34
Références	35

Note des éditeurs

Les commotions cérébrales sont considérées comme un problème de santé publique et présentent un grand intérêt pour les milieux médicaux, sportifs, éducationnels et scientifiques.

Au cours des 20 dernières années, les spécialistes du Centre de traumatologie de l'Hôpital de Montréal pour enfants, Centre universitaire de santé McGill, ont fait preuve de leadership dans le domaine, en élaborant et en mettant en œuvre une approche novatrice, globale, proactive et interprofessionnelle de la gestion des commotions cérébrales chez les jeunes. Cette approche est conforme aux données probantes les plus récentes, et repose sur une vaste expertise clinique.

La 3^e édition du KiT pour les commotions cérébrales nous offre encore une fois l'occasion de combiner nos connaissances et notre expertise en traumatologie avec des stratégies reconnues de prévention des blessures afin de les appliquer aux multiples facettes de la vie d'un enfant ou d'un adolescent à l'école, au jeu et à la maison. Les messages clés véhiculés dans le KiT sont : 1) reconnaître les symptômes de manière précoce, 2) consulter un médecin pour obtenir un diagnostic, 3) suivre les recommandations de gestion des activités physiques, cognitives et académiques, 4) ne jamais jouer blessé, et 5) permettre un retour complet aux activités après la résolution des symptômes et le faire de manière graduelle.

Nous sommes fiers de vous présenter la 3^e édition du KiT pour les commotions cérébrales du Centre de traumatologie de l'Hôpital de Montréal pour enfants, Centre universitaire de santé McGill. Vous y trouverez :

- Informations sur la prévention, la détection et la gestion des commotions.
- Plan général de gestion des activités.
- Plan de retour à l'apprentissage scolaire.
- Plan de retour aux activités physiques et aux sports.
- Conseils à l'intention des enseignants et des éducateurs.
- Références.

La prévention, la détection et la prise en charge des enfants et des adolescents ayant subi une commotion cérébrale est un défi, et fait l'objet d'une grande attention. Notre KiT est donc conçu pour fournir des informations importantes à notre public cible composé de cliniciens, d'enseignants, d'éducateurs, d'entraîneurs, d'associations sportives professionnelles, de décideurs, de parents, de patients, des médias et d'organisations communautaires, visant à améliorer la compréhension de la condition, et de soutenir l'enfant ou l'adolescent au long de ses étapes de récupération.

Éditeurs et contributeurs

ÉDITEURS

Debbie Friedman, BSc. pht. M. Mgmt.

Directrice de la traumatologie
Directrice, Système canadien hospitalier d'information et de recherche
en prévention des traumatismes
Hôpital de Montréal pour enfants, Centre universitaire de santé McGill
Professeur adjointe, Département de pédiatrie et chirurgie pédiatrique
Vice-doyenne adjointe, Affaires étudiantes
Faculté de médecine, Université McGill

Amanda Fitzgerald, BA

Spécialiste en procédés administratifs, Traumatologie
Hôpital de Montréal pour enfants, Centre universitaire de santé McGill

Isabelle Gagnon, pht, PhD

Physiothérapeute, Chercheuse-clinicienne
Traumatologie et Médecine d'urgence pédiatrique
Hôpital de Montréal pour enfants, Centre universitaire de santé McGill
Professeure agrégée, École de physiothérapie et d'ergothérapie
Faculté de médecine, Université McGill

ÉDITEURS DE SECTIONS

Christine Beaulieu, BSc, pht

Physiothérapeute
Programme de TCCL / Clinique de commotions cérébrales
Hôpital de Montréal pour enfants, Centre universitaire de santé McGill

Lisa Grilli, pht MSc

Coordonnatrice en traumatologie
Programme de TCCL / Clinique de commotions cérébrales
Coordonnatrice en traumatologie
Programme de recherche en traumatologie
Hôpital de Montréal pour enfants, Centre universitaire de santé McGill

Helen Kocilowicz, BScN

Coordonnatrice en traumatologie
Programme de TCCL / Clinique de commotions cérébrales
Hôpital de Montréal pour enfants, Centre universitaire de santé McGill

RÉVISION DU CONTENU MÉDICAL

Alexander Sasha Dubrovsky, MD MSc FRCPC

Urgentologue pédiatrique et Conseiller en commotions cérébrales
Hôpital de Montréal pour enfants, Centre universitaire de santé McGill
Professeur adjoint, Département de pédiatrie
Division de médecine d'urgence
Faculté de médecine, Université McGill

Barry Slapcoff, M.D.C.M., CCFP

Médecin de famille
Professeur adjoint, Département de médecine de famille
Faculté de médecine, Université McGill

CONTRIBUTEURS

Fatemeh Bahrpeyma, M.A.

Coordonnatrice administrative
Programme de TCCL / Clinique de commotions cérébrales
Hôpital de Montréal pour enfants, Centre universitaire de santé McGill

Carlo Galli, BSc, pht

Physiothérapeute
Programme de TCCL / Clinique de commotions cérébrales
Hôpital de Montréal pour enfants, Centre universitaire de santé McGill

Karine Gauthier, M.Ps., Ph.D.

Neuropsychologue / Psychologue clinicienne
Programme de TCCL / Clinique de commotions cérébrales
Hôpital de Montréal pour enfants, Centre universitaire de santé McGill

Marielle Purdy, Ph.D. Psy.D

Psychologue clinicienne
Programme de TCCL / Clinique de commotions cérébrales
Hôpital de Montréal pour enfants, Centre universitaire de santé McGill

Diane Richard, BScN

Coordonnatrice en traumatologie
Programmes de neurotraumatologie / traumatologie / grands brûlés
Hôpital de Montréal pour enfants, Centre universitaire de santé McGill

Debbie Schichtman, RN BN

Coordonnatrice en traumatologie
Programme de TCCL / Clinique de commotions cérébrales
Hôpital de Montréal pour enfants, Centre universitaire de santé McGill

Meghan Straub, BSc, M.Sc A. pht

Physiothérapeute
Programme de TCCL / Clinique de commotions cérébrales
Hôpital de Montréal pour enfants, Centre universitaire de santé McGill

Maria Sufrategui, Ph.D.

Neuropsychologue / Psychologue clinicienne
Programme de TCCL / Clinique de commotions cérébrales
Hôpital de Montréal pour enfants, Centre universitaire de santé McGill

Nicolas Leclair

Conception et réalisation graphique



FAITS | Une commotion cérébrale...

- Peut être causée par un coup à la tête, au visage, au cou ou au corps, ou par des forces d'accélération/décélération.
- N'apparaît habituellement pas à l'imagerie médicale courante : des symptômes peuvent donc être présents même si le CT scan ou le rayon-X sont normaux.
- Est la forme la plus fréquente de traumatisme cérébral subi par les athlètes, les enfants et les adolescents.
- Peut être associée à une perte de connaissance.
- Peut affecter l'équilibre, le temps de réaction, la manière de penser et la mémoire.
- Peut se manifester par une gamme de symptômes qui peuvent apparaître immédiatement, des heures plus tard ou dans les jours qui suivent.
- Implique que l'enfant ou l'adolescent devrait consulter un médecin afin qu'il confirme le diagnostic.

Qu'est-ce qu'une commotion cérébrale

- > Une commotion cérébrale est un type de traumatisme au cerveau
- > Une commotion cérébrale est aussi appelée traumatisme craniocérébral léger (TCCL)

CAUSES FRÉQUENTES D'UNE COMMOTION





FAITS | **Signes et symptômes**

Les signes et les symptômes peuvent survenir pendant les premières 24-48 heures. Il est primordial d'observer l'enfant ou l'adolescent car il pourrait ne pas rapporter les symptômes correctement.

Reconnaître une commotion cérébrale

- On doit soupçonner une commotion cérébrale si l'un des signes ou symptômes suivants est présent après une blessure :



SYMPTÔMES RAPPORTÉS PAR L'ENFANT OU L'ADOLESCENT

- Mal de tête.
- Nausée.
- Vomissements.
- Étourdissements.
- Se sent bizarre et confus.
- Trouble de mémoire.
- Trouble de l'équilibre ou de la coordination.
- Somnolence ou fatigue.
- Irritabilité.
- Agitation.
- Vision double ou floue.
- Sensibilité à la lumière, au bruit et aux mouvements.
- Ne se sent pas comme d'habitude.



SIGNES OBSERVÉS PAR AUTRUI

- Confus/désorienté, ne peut indiquer : l'heure, le lieu, l'activité.
- Ne peut se rappeler ce qui est arrivé avant, pendant ou après la blessure.
- Une brève perte de connaissance (assommé).
- Facilement distrait, difficulté à se concentrer, attention diminuée.
- Ne joue pas aussi bien qu'à l'habitude. Comportement au jeu inapproprié.
- Manque de coordination.
- Lenteur à répondre aux questions ou à suivre les directives.
- Émotions bizarres ou inappropriées (i.e. rire, pleurer, se fâcher facilement).
- Regard vide.

Appelez le 911 si l'enfant ou l'adolescent perd connaissance, a de la difficulté à respirer, se plaint de faiblesse ou d'engourdissement dans un membre ou présente des convulsions. Il y a possibilité de blessure au cou, ne le bougez pas.



FAITS | **Une commotion
est un traumatisme cérébral**

Reconnaissez les symptômes, consultez un médecin pour confirmer le diagnostic et ne jouez pas blessé !

Prendre en charge une commotion cérébrale

> Si vous soupçonnez une commotion cérébrale :

- Retirez l'enfant ou l'adolescent de l'activité et consultez un médecin immédiatement.
- Assurez-vous que ses parents ou ceux qui s'occupent de lui soient informés de la blessure.
- Ne le laissez pas seul. La surveillance d'un adulte est essentielle.
- Ne lui permettez pas de retourner à l'activité, la partie ou l'entraînement. En cas de doute, s'abstenir !



Si l'enfant ou l'adolescent présente l'un des symptômes suivants dans les 24-48 heures après la blessure, même après avoir consulté un médecin, il doit se rendre immédiatement à l'urgence d'un hôpital :

- Perte ou détérioration de l'état de conscience.
- Aggravation du mal de tête, en particulier s'il est localisé.
- Vomissements persistants.
- Changements de comportement (irritabilité persistante chez les jeunes enfants ; augmentation de l'agitation chez les adolescents).
- Somnolence excessive (difficulté à le réveiller).
- Difficultés à voir, entendre, parler ou marcher.
- Convulsions.
- Confusion ou désorientation (ne reconnaît pas les gens ou les lieux).

À quoi s'attendre après une commotion cérébrale

- Habituellement, les signes et les symptômes causés par une commotion cérébrale diminuent graduellement au cours des 2 à 4 semaines suivant la blessure, mais dans certains cas, ils peuvent durer plus longtemps.

Les symptômes fréquemment rapportés sont : maux de tête, étourdissements, nausées, troubles du sommeil, fatigue, irritabilité, troubles de la vision, sensibilité à la lumière, aux sons et aux mouvements, troubles de mémoire, de concentration, d'attention ou de l'équilibre.

Après une commotion cérébrale, il faut s'attendre à ce que l'enfant ou l'adolescent présente une plus grande sensibilité aux mouvements de rotation et de pivotement.

Des commotions cérébrales répétées peuvent présenter des conséquences à long terme, surtout si elles surviennent rapidement l'une après l'autre. Dans ce cas, il est recommandé de consulter le Programme TCCL – Clinique des commotions cérébrales.

Il est très important de **modifier et de gérer les activités physiques, cognitives et académiques jusqu'à ce que l'enfant ou l'adolescent ne présente aucun symptôme**. Ceci permettra de réduire les risques de développer des symptômes persistants. Le *Plan général de gestion des activités* fournira des conseils sur la gestion du niveau d'activités.

Si la condition ne s'est pas améliorée au cours des 10 JOURS suivant la commotion cérébrale, il est recommandé de consulter le Programme de TCCL – Clinique des commotions cérébrales. Veuillez noter qu'un formulaire de consultation médicale est requis.

TÉLÉPHONE : 514-412-4400, POSTE 23310

TÉLÉCOPIER RÉFÉRENCES MÉDICALES : 514-412-4254

LE RETOUR À L'ÉCOLE, AUX ACTIVITÉS PHYSIQUES/SPORTS ET RÉCRÉATIVES APRÈS UNE COMMOTION CÉRÉBRALE

Pendant la récupération, l'objectif vise à établir le bon niveau d'activités physiques et cognitives qui empêchera l'aggravation des symptômes présents ou l'apparition de nouveaux symptômes.

Régulariser le plus rapidement possible la vie de l'enfant ou de l'adolescent constitue la clé du maintien de son équilibre psychosocial.

Les trois plans suivants indiquent comment reprendre graduellement les activités et devraient servir à guider la période de récupération.

PLAN GÉNÉRAL DE GESTION DES ACTIVITÉS

Pages 14–18

PLAN DE RETOUR À L'APPRENTISSAGE SCOLAIRE

Pages 20–29

Incluant des recommandations aux enseignants



PLAN DE RETOUR AUX ACTIVITÉS PHYSIQUES ET AUX SPORTS

Pages 31–33

Rappel : il n'est pas permis de reprendre complètement les sports tant que la reprise des activités cognitives et académiques sans mesures d'adaptation n'est pas terminée.

PLAN GÉNÉRAL DE GESTION DES ACTIVITÉS

PHASE 1 — TRÈS SYMPTOMATIQUE

Bref repos physique et cognitif

	
ACTIVITÉS PHYSIQUES	<ul style="list-style-type: none">✘ Ne faites pas de sports (observer ou participer).✘ Ne participez pas aux jeux actifs pendant les récréations.
DOMICILE ET LOISIRS	<ul style="list-style-type: none">✘ N'écoutez pas la télévision.✘ Ne jouez pas aux jeux vidéos.✘ N'envoyez pas de textos (vous pouvez parler au téléphone).✘ N'utilisez pas les ordinateurs et tablettes.✘ Ne participez pas aux cours de musique.✘ N'allez pas au cinéma.✘ N'allez pas à des <i>party</i>.✘ N'allez pas aux centres commerciaux.✘ Ne conduisez pas un véhicule motorisé.✘ Ne buvez pas d'alcool.✘ Ne prenez pas de drogues.
ÉCOLE	<ul style="list-style-type: none">✘ N'ALLEZ PAS À L'ÉCOLE PENDANT LES 2 PREMIERS JOURS APRÈS LA COMMOTION CÉRÉBRALE. Lors de votre retour à l'école, suivre le <i>Plan de retour à l'apprentissage scolaire</i> (p. 20).

GESTION DES SYMPTÔMES



- ✓ Faire de courtes promenades de 10-15 minutes selon la tolérance.
- ✓ Se rafraîchir en piscine (pas de longueurs/plongeurs/sauts).
- ✓ Cuisiner.
- ✓ Jouer à des jeux de société.
- ✓ Écouter de la musique relaxante.
- ✓ Faire de l'artisanat.
- ✓ Socialiser avec des amis à la maison.
- ✓ Lire (limitez la durée de lecture à un maximum de 15 minutes).

- Les médicaments comme l'acétaminophène et/ou l'ibuprofène peuvent être pris pendant 3 à 5 jours au besoin. L'ibuprofène ne doit pas être pris dans les premières 24 heures qui suivent la blessure, à moins d'avis contraire de votre médecin. **Bien lire les étiquettes pour connaître les directives de dosage et les avertissements.** Si ce médicament est encore nécessaire après 3-5 jours, **diminuez-le** à un maximum de **3 doses par semaine**. En cas de doute, consultez votre pédiatre, médecin de famille ou clinique locale.
- Buvez de l'eau régulièrement (la déshydratation peut contribuer aux maux de tête).
- Dormez 8-10 heures par nuit.
- Ne sautez pas de repas.
- Si les maux de tête sont constants et handicapants, revenez à l'urgence afin qu'ils soient pris en charge.



LORSQUE LES SYMPTÔMES COMMENCENT À S'AMÉLIORER (APRÈS ENVIRON 2 JOURS), PASSEZ À LA **PHASE 2**

PLAN GÉNÉRAL DE GESTION DES ACTIVITÉS

PHASE 2 — MOINS SYMPTOMATIQUE

Capable de participer aux activités à son propre rythme en gérant ses symptômes

	
ACTIVITÉS PHYSIQUES	<ul style="list-style-type: none">✘ Ne faites pas de sports (observer ou participer).✘ Ne participez pas aux jeux actifs pendant les récréations.
DOMICILE ET LOISIRS	<ul style="list-style-type: none">✘ Ne jouez pas aux jeux vidéo.✘ Ne participez pas aux cours de musique.✘ N'allez pas au cinéma.✘ N'allez pas à des <i>party</i>.✘ N'allez pas aux centres commerciaux.
ÉCOLE	Voir les directives décrites dans la PHASE 2 du <i>Plan de retour à l'apprentissage scolaire</i> (p. 20).

GESTION DES SYMPTÔMES

- En plus des recommandations de la **PHASE 1**, consultez un médecin si vous présentez des troubles de sommeil importants.



- ✓ Faire de courtes promenades de 15-20 minutes selon la tolérance.
- ✓ Se rafraîchir en piscine (pas de longueurs/plongeurs/sauts).
- ✓ **SI BIEN TOLÉRÉ**
Peut débiter l'**ÉTAPE 1** du *Plan de retour aux activités physiques et aux sports* (p. 32). Ne pas passer à l'étape 2 tant que les symptômes sont présents.

- ✓ Regarder la télévision pendant 30 minutes. Si les symptômes n'augmentent pas ou n'apparaissent pas pendant ou après, on peut augmenter la durée pendant les jours suivants.
- ✓ Lire pendant de courtes périodes (10-15 minutes) jusqu'à 3 fois par jour. Si les symptômes n'augmentent pas ou n'apparaissent pas pendant ou après, on peut augmenter selon la tolérance.
- ✓ Utiliser les ordinateurs et envoyer des textos pour de courtes périodes (10-15 minutes) jusqu'à 3 fois par jour. Si les symptômes n'augmentent pas ou n'apparaissent pas pendant ou après, on peut augmenter selon la tolérance.

Ne pas enfiler ces activités l'une après l'autre. Laisser du temps entre les activités pour évaluer les symptômes.

Si vous n'êtes pas capable de réaliser ces activités 10 jours après la commotion, contactez le Programme TCCL – Clinique des commotions cérébrales : 514-412-4400 poste 23310.

Voir les recommandations pour la reprise progressive de la charge de travail dans le *Plan de retour à l'apprentissage scolaire* (p. 21).

RECOMMANDATIONS ADDITIONNELLES AUX ADOS

- Pas de *party* ni de cinéma car la lumière et les bruits forts peuvent provoquer des maux de tête.
- Évitez la conduite d'un véhicule motorisé jusqu'à la disparition des symptômes.
- Pas de boissons stimulantes, d'alcool, ni de drogues, sous aucun prétexte.



LORSQUE LES SYMPTÔMES SONT COMPLÈTEMENT DISPARUS DEPUIS QUELQUES JOURS, PASSEZ À LA PHASE 3

PLAN GÉNÉRAL DE GESTION DES ACTIVITÉS

PHASE 3 – LES SYMPTÔMES SONT COMPLÈTEMENT DISPARUS DEPUIS QUELQUES JOURS

Reprise graduelle des évaluations et des activités physiques

	
ACTIVITÉS PHYSIQUES	 Reprise progressive des sports et des activités physiques en appliquant les directives du <i>Plan de retour aux activités physiques et aux sports</i> (p. 32).
DOMICILE ET LOISIRS	 Reprise des activités quotidiennes habituelles.
ÉCOLE	 Reprise progressive des évaluations en appliquant les directives de la PHASE 3 du <i>Plan de retour à l'apprentissage scolaire</i> (p. 28).



FAITS | **Prendre en charge
une commotion cérébrale**

Pour favoriser la récupération, respectez les recommandations présentées à chaque phase.

PLAN DE RETOUR À L'APPRENTISSAGE SCOLAIRE

PHASE 1 – TRÈS SYMPTOMATIQUE

Repos physique et intellectuel

		
PRÉSENCE À L'ÉCOLE	 N'ALLEZ PAS À L'ÉCOLE PENDANT LES 2 PREMIERS JOURS APRÈS LA COMMOTION CÉRÉBRALE.	 Suivre le <i>Plan Général de gestion des activités</i> (p. 14).

PHASE 2 – MOINS SYMPTOMATIQUE

Capable de participer à son propre rythme en gérant ses symptômes

	
PRÉSENCE À L'ÉCOLE	<ul style="list-style-type: none"> Ne participez pas aux cours de musique ou de théâtre. Ne participez pas aux cours d'éducation physique et ne faites pas de sports (observer ou participer). Ne participez pas aux jeux actifs pendant la récréation, la période du dîner ou après l'école.
ÉVALUATIONS	<ul style="list-style-type: none"> Ne faites pas d'examens, de tests ou de quiz. Ne faites pas de présentations orales pendant les premiers jours.



LORSQUE LES SYMPTÔMES COMMENCENT
À S'AMÉLIORER, PASSEZ À LA **PHASE 2**



**RETOURNEZ À L'ÉCOLE DÈS LE JOUR 3 APRÈS LA COMMOTION
POUR 1 OU 2 DEMI-JOURNÉES.**

✔ **SI TOLÉRÉ :**

Progresser vers des journées complètes avec des pauses.

✔ **SI NON TOLÉRÉ :**

N'allez pas à l'école pour un autre 2 jours puis réessayez quelques demi-journées. Si la condition ne s'est pas améliorée au cours des 10 jours suivant la commotion cérébrale, contactez le Programme TCCL-Clinique des commotions cérébrales au 514-412-4400 poste 23310.

Suite à la page suivante ➔

PLAN DE RETOUR À L'APPRENTISSAGE SCOLAIRE

PHASE 2 (suite)

	
CHARGE DE TRAVAIL	<ul style="list-style-type: none">✘ Ne faites pas de devoirs pour quelques jours.✘ Évitez les cours particuliers ou de rattrapage pendant les premiers jours.
PRISE DE NOTES	<ul style="list-style-type: none">✘ Ne prenez pas de notes si cela augmente vos symptômes.
PAUSES	<ul style="list-style-type: none">✘ Ne fréquentez pas les environnements bruyants et très stimulants (par exemple la cafétéria, les corridors, le gymnase).
LECTURE ET ÉCRANS	<ul style="list-style-type: none">✘ Ne regardez pas et ne vous concentrez pas sur les tableaux blancs interactifs les premiers jours.✘ N'utilisez pas d'ordinateurs et de tablettes les premiers jours.✘ Ne lisez pas, si cela cause des maux de tête.



LORSQUE LES JOURNÉES COMPLÈTES SONT TOLÉRABLES :

- ✔ Commencez les devoirs avec des périodes de 15 minutes, maximum 3 fois par jour. Selon la tolérance, augmentez la durée des sessions de 5 à 10 minutes (si les symptômes augmentent ou surviennent, arrêtez, reposez-vous, et essayez plus tard pour de plus courtes périodes).
- ✔ Tenez-vous à jour avec la matière des cours et révisez-la en courtes périodes.
- ✔ Pour les premiers jours, écoutez seulement. Par la suite, commencez à prendre des notes et continuez tant que les symptômes n'augmentent pas.
- ✔ Mangez dans un endroit calme.
- ✔ Allez à la bibliothèque pendant les pauses (n'y faites pas vos devoirs).
- ✔ Quittez la classe 5 minutes avant la fin des cours pour éviter le bruit et la congestion des corridors.
- ✔ Continuez de prendre des pauses aussi souvent que nécessaire pour aider à gérer les symptômes.
- ✔ En cas de sensibilité à la lumière, portez des lunettes de soleil ou une casquette en classe.
- ✔ Utilisez les livres sonores ; demandez à quelqu'un de vous faire la lecture.
- ✔ Ne lisez que pour les activités scolaires et non pas pour le plaisir. Lisez pendant des périodes de 15 à 30 minutes à la fois et augmentez selon la tolérance.
- ✔ Demandez les travaux et/ou les devoirs en version papier.
- ✔ Commencez l'utilisation des écrans à l'école pour des périodes de 15 à 30 minutes et augmentez selon la tolérance.



LORSQUE LES SYMPTÔMES SONT COMPLÈTEMENT
DISPARUS, PASSEZ À LA **PHASE 3**

PLAN DE RETOUR À L'APPRENTISSAGE SCOLAIRE

PHASE 2 (suite)



RECOMMANDATIONS AUX ENSEIGNANTS

PRÉSENCE À L'ÉCOLE	<ul style="list-style-type: none">✓ Permettez à l'élève de prendre les pauses qui lui sont nécessaires, par exemple journée raccourcie, cours abrégé, arrivée tardive ou départ précoce.
ÉVALUATIONS	<ul style="list-style-type: none">✓ Lorsque l'élève peut faire des journées complètes, permettez lui de donner une présentation orale préparée à l'avance. Permettez lui de lire le texte.
CHARGE DE TRAVAIL	<ul style="list-style-type: none">✓ Accordez plus de temps pour la remise des devoirs et les travaux.✓ Diminuez la charge de travail.
PRISE DE NOTES	<ul style="list-style-type: none">✓ À l'avance, fournissez à l'élève des notes ou une description de cours.✓ Permettez à l'élève de photocopier les notes d'un autre élève.
PAUSES	<ul style="list-style-type: none">✓ Permettez à l'élève de planifier une pause le matin et une autre l'après-midi.✓ Permettez à l'élève d'assister à un cours sur deux.
LECTURE ET ÉCRANS	<ul style="list-style-type: none">✓ Permettez à l'élève de choisir sa place en classe (à l'arrière, en cas de sensibilité à l'écran ou loin des fenêtres, en cas de sensibilité à la lumière).✓ Permettez l'utilisation des livres sonores.✓ Permettez à l'élève de porter des lunettes de soleil ou une casquette en cas de sensibilité de la lumière.✓ Permettez à une autre personne de lire à l'étudiant.

- ✔ Permettez une bouteille d'eau en classe.
- ✔ Si le consentement a été donné, permettez la prise d'analgésiques pour soulager les maux de tête.
- ✔ Pour noter l'élève, remplacez les évaluations formelles par des travaux à faire à la maison à son propre rythme.
- ✔ Pour les évaluations formelles, notez selon les résultats antérieurs à la blessure.
- ✔ Permettez à l'élève de travailler à son propre rythme afin de suivre uniquement le matériel essentiel des cours.
- ✔ Permettez à l'élève d'enregistrer les cours.
- ✔ Pour les devoirs, offrez la possibilité d'être aidé par un autre élève.
- ✔ Permettez à l'élève de quitter la classe plus tôt afin d'éviter les corridors bruyants.
- ✔ Permettez à l'élève de manger dans un endroit calme.
- ✔ Permettez à l'élève de porter des bouchons d'oreille.
- ✔ Remettez les travaux et/ou les devoirs en version papier.
- ✔ Permettez à l'élève de commencer la lecture pour des périodes de 15-30 minutes. Augmentez la durée selon la tolérance.
- ✔ Permettez à l'élève de commencer l'utilisation des écrans à l'école pour des périodes de 15 à 30 minutes. Augmentez selon la tolérance.



LORSQUE LES SYMPTÔMES SONT COMPLÈTEMENT
DISPARUS, PASSEZ À LA **PHASE 3**

PLAN DE RETOUR À L'APPRENTISSAGE SCOLAIRE

PHASE 2 (suite)

COMPRENDRE LES RESTRICTIONS SCOLAIRES

PRÉSENCE À L'ÉCOLE

- Un retour à l'apprentissage scolaire trop précoce peut considérablement augmenter les symptômes et nuire à la récupération.
- Éviter les cours de musique et de théâtre permet de diminuer les stimulés.
- Des pauses adéquates faciliteront le retour à l'apprentissage.
- Il est important de reprendre les activités scolaires et de les régulariser en fonction de la tolérance aux symptômes.
- Restreindre les activités physiques comme les cours d'éducation physique et les récréations peuvent permettre d'éviter un autre coup à la tête.

ÉVALUATIONS

- Être soumis à des évaluations peut faire augmenter les maux de tête, la fatigue mentale et le stress. De plus, les notes pourraient ne pas refléter les résultats habituels de l'élève.

CHARGE DE TRAVAIL

- À cause de la diminution de la rapidité d'exécution et de la capacité de concentration, un élève qui a subi une commotion cérébrale peut avoir besoin de plus de temps pour compléter ses travaux.
- L'anxiété de l'élève à propos du retard scolaire peut être diminuée en lui permettant de travailler à son propre rythme.

PRISE DE NOTES

- Un élève qui a subi une commotion cérébrale peut éprouver des difficultés à faire plusieurs choses en même temps.
- Les mouvements des yeux et de la tête nécessaires pour la prise de notes peuvent provoquer des maux de tête, des étourdissements et de la fatigue.

PAUSES

- Les environnements très stimulants et les périodes prolongées de concentration peuvent augmenter ou provoquer les symptômes.

LECTURE ET ÉCRANS

- Un élève qui a subi une commotion cérébrale peut éprouver des difficultés à lire sur des écrans en raison de la luminosité ou de la fatigue oculaire. Sa tolérance devrait s'améliorer à mesure que les symptômes disparaissent.



LORSQUE LES SYMPTÔMES SONT COMPLÈTEMENT
DISPARUS, PASSEZ À LA **PHASE 3**



FAITS | Récupération

Pour favoriser la récupération, il est important de gérer les activités.

PLAN DE RETOUR À L'APPRENTISSAGE SCOLAIRE

PHASE 3 – LES SYMPTÔMES SONT COMPLÈTEMENT DISPARUS DEPUIS QUELQUES JOURS

Reprise graduelle des évaluations et des activités physiques

		
PRÉSENCE À L'ÉCOLE	AUCUNE RESTRICTION.	<ul style="list-style-type: none">✔ VOUS DEVRIEZ DÉJÀ ALLER À L'ÉCOLE POUR DES JOURNÉES COMPLÈTES.✔ Reprenez les cours de musique et de théâtre.✔ Commencez à appliquer les directives du <i>Plan de retour aux activités physiques et aux sports</i> (p. 32).
ÉVALUATIONS	Voir les recommandations aux enseignants.	<ul style="list-style-type: none">✔ Reprenez les évaluations de manière graduelle.
CHARGE DE TRAVAIL	Aucune restriction.	<ul style="list-style-type: none">✔ Reprenez la charge de travail habituelle.
PRISE DE NOTES	Aucune restriction.	<ul style="list-style-type: none">✔ Reprenez la prise de notes habituelle en classe.
PAUSES	Aucune restriction.	<ul style="list-style-type: none">✔ Reprenez l'horaire habituel des cours.
LECTURE ET ÉCRANS	Aucune restriction.	<ul style="list-style-type: none">✔ Reprenez les activités habituelles de la classe.



RECOMMANDATIONS AUX ENSEIGNANTS

Aucune restriction.

La plupart des élèves vont nécessiter ces adaptations pour une période de 2 semaines :

- ✔ Coordonnez les évaluations et la charge de travail de l'élève entre les différents enseignants.
- ✔ Fournissez à l'élève un horaire progressif de retour aux évaluations.
- ✔ Allouez plus de temps pour compléter les évaluations.
- ✔ Répartissez les évaluations sur plusieurs périodes.
- ✔ Lorsque c'est possible, favorisez les examens à livre ouvert ou les examens maison.
- ✔ Utilisez des questions à choix multiples plutôt qu'à développement.
- ✔ Offrez de passer les évaluations dans un environnement tranquille.
- ✔ Diminuez la longueur des évaluations.
- ✔ Laissez passer 1 à 2 jours entre les évaluations.
- ✔ Permettez à l'élève de prendre les pauses qui lui sont nécessaires.

Aucune restriction.

Aucune restriction.

Aucune restriction.

Aucune restriction.

COMPRENDRE LES RESTRICTIONS SCOLAIRES

PRÉSENCE À L'ÉCOLE

- L'élève a bien récupéré. Aucune adaptation n'est requise. Avant de reprendre les cours d'éducation physique, l'élève doit appliquer les directives du *Plan de retour aux activités physiques et aux sports* qui lui ont été fournies.

ÉVALUATIONS

- L'élève a bien récupéré et est prêt à se soumettre progressivement à des évaluations.

CHARGE DE TRAVAIL

- L'élève doit reprendre la matière vue en classe, les devoirs et les travaux manqués ou en retard.



Important : Le cerveau a besoin de temps pour guérir

- Après une commotion cérébrale, il faut être complètement rétabli avant de reprendre complètement les activités physiques, les sports et la compétition.
- Continuer à pratiquer un sport ou une activité récréationnelle en présence de symptômes peut entraîner une récupération plus longue.
- Si une autre commotion cérébrale survient avant la disparition complète des signes et des symptômes de la commotion cérébrale précédente, une affection rare mais mortelle appelée syndrome du second impact peut entraîner rapidement un grave œdème cérébral et des répercussions catastrophiques.

Le retour aux activités physiques et aux sports après une commotion cérébrale

- Si vous avez subi une commotion cérébrale, il est recommandé de suivre ces étapes avant de reprendre complètement les activités physiques et le sport.

Vous êtes maintenant rendus à la PHASE 3 du *Plan général de gestion des activités*

- Vous avez respecté la période de restrictions d'activités recommandée.
- Les symptômes sont complètement disparus depuis quelques jours ou vous avez été conseillé par un médecin ou un spécialiste des commotions cérébrales, et vous êtes prêts à entreprendre les étapes progressives qui suivent (p. 32).
- Une autorisation écrite peut être exigée avant le retour complet aux activités/compétitions.



PLAN DE RETOUR AUX ACTIVITÉS PHYSIQUES ET AUX SPORTS



ÉTAPE 1

Exercices légers de conditionnement général



**EFFORT
50 %**

- **AUCUN CONTACT.**
- Commencez par 10-15 minutes d'échauffement (étirements/flexibilité).
- Enchaînez avec un entraînement cardio de 15-20 minutes pouvant comporter: vélo stationnaire, exercice elliptique, tapis roulant, marche rapide, jogging léger, aviron ou natation.

Si vous avez déjà complété cette étape lors de la PHASE 2 du Plan général de gestion des activités (p. 16), Vous pouvez débiter à l'ÉTAPE 2.



ÉTAPE 2

Conditionnement général et habiletés spécifiques au sport effectuées individuellement



**EFFORT
50-60 %**

- **AUCUN CONTACT.**
- Commencez par 10-15 minutes d'échauffement (étirements/flexibilité).
- Augmentez l'intensité et la durée de l'entraînement cardio à 20-30 minutes.
- Commencez les exercices d'habiletés spécifiques au sport, mais sans pirouettes, plongeurs ou sauts.



ÉTAPE 3

Conditionnement général et habiletés spécifiques au sport pratiquées avec un coéquipier



**EFFORT
75 %**

- **AUCUN CONTACT.**
- Augmentez la durée de l'entraînement cardio à 60 minutes. Commencez l'entraînement en résistance en incluant des exercices pour renforcer le cou et le tronc.
- Continuez à pratiquer en solo les exercices d'habiletés spécifiques au sport.
- Commencez les exercices avec un coéquipier: lancers, coups de pieds et passes.
- Commencez les pirouettes, les plongeurs et les sauts de niveau débutant.

On devrait laisser s'écouler environ 24 heures ou plus entre chaque étape. Si les symptômes réapparaissent, peu importe le moment, cessez l'entraînement. Reposez-vous jusqu'à ce que les symptômes aient disparu pendant 24 heures. Ensuite, reprenez à l'étape précédente. Si les symptômes ne disparaissent pas ou s'aggravent, consultez un médecin ou un spécialiste en commotion cérébrale.



ÉTAPE 4

Conditionnement général, habiletés spécifiques au sport et pratiques en équipe



**EFFORT
75-90 %**

- **AUCUN CONTACT, AUCUNE MÊLÉE.**
- Reprenez les mêmes entraînements et pratiques en équipe qu'avant la blessure.
- Augmentez l'entraînement en résistance et l'intensité des exercices d'habiletés spécifiques au sport/activité.
- Rehaussez graduellement le niveau des pirouettes, des plongeurs et des sauts.

Passez à l'ÉTAPE 5 seulement si un retour complet aux activités cognitives et académiques sans mesures d'adaptation a été effectué.



ÉTAPE 5

Pratique d'équipe complète avec contacts physiques



**EFFORT
90-100 %**

- **CONTACTS ET MÊLÉES PERMIS.**
- Effectuez une pratique complète. Si vous arrivez à la fin de l'entraînement sans avoir éprouvé de symptômes, discutez avec l'entraîneur de votre retour au jeu.

Avant d'entreprendre l'étape suivante, il faut que :

- Les entraîneurs s'assurent que l'athlète soit revenu à son niveau de jeu antérieur à la blessure.
- L'enfant ou l'adolescent ait confiance en ses moyens de retour au jeu.




ÉTAPE 6

RETOUR COMPLET AUX ACTIVITÉS/COMPÉTITIONS.



**EFFORT
100 %**



CONSEILS DE PRÉVENTION

- Portez l'équipement protecteur adapté et normalisé pour le sport/activité et assurez-vous qu'il est bien ajusté.
- Inspectez le casque protecteur régulièrement et remplacez-le selon les recommandations du fabricant.
- Vérifiez les autres pièces d'équipement de protection (par exemple le protège-dents).
- Le port du casque diminue la gravité des blessures au cerveau.
- Il est primordial d'être bien préparé physiquement, bien entraîné et de connaître les bonnes techniques de jeu.
- Ne participez qu'à des activités appropriées à votre âge et à votre niveau d'habiletés.
- Il est essentiel de faire preuve de fair-play : travaillez en équipe, démontrez un bon esprit d'équipe, respectez les règles du jeu et encouragez la tolérance zéro à l'égard de la violence.
- Tenez compte des facteurs environnementaux tels que la condition des surfaces de jeu, de la glace ou de toute autre installation sportive.

Références

- Davis, G.A., Purcell, L., Schneider, K.J., Yeates, K.O., Gioia, G.A., Anderson, V., Ellenbogen, R.G., Echemendia, R.J., Makdissi, M., Sills, A., Iverson, G.L., Dvorak, J., McCrory, P., Meeuwisse, W., Patricios, J., Giza, C.C., & Kutcher, J.S. (2017). "The Child Sport Concussion Assessment Tool 5th Edition (Child SCAT5)." *British Journal of Sports Medicine*.
- DiFazio, M., Silverberg, N.D., Kirkwood, M.W., Bernier, R., Iverson, G.L. (2016). Prolonged Activity Restriction After Concussion: Are We Worsening Outcomes? *Clin Pédiatre (Phila)* 55(5), 443-451.
- Gagnon, I., Grilli, L., Friedman, D., Iverson, G.L. (2016). A Pilot Study of Active Rehabilitation for Adolescents who are Slow to Recover from Sport-Related Concussion. *Scandinavian Journal of Medicine & Science in Sports* 26(3), 299-306.
- Gauvin-Lepage, J., Friedman, D., Grilli, L., Kocilowicz, H., Sufategui, M., DeMatteo, C., Iverson, G.L., Gagnon, I. (2016). Active Rehabilitation for Youth who are Slow to Recover from Concussion. *Brain Injury* 30(5-6), 571.
- Gioia, G.A., Collins, M., & Isquith, P.K. (2008). Improving Identification and Diagnosis of Mild Traumatic Brain Injury with Evidence: Psychometric Support for the Acute Concussion Evaluation. *Journal of Head Trauma Rehabilitation* 23(4), 230-242.
- Grool, A. M., M. Aglipay, F. Momoli, W. P. Meehan, 3rd, S. B. Freedman, K. O. Yeates, J. Gravel, I. Gagnon, K. Boutis, W. Meeuwisse, N. Barrowman, A. A. Ledoux, M. H. Osmond, R. Zemek and T. Pediatric Emergency Research Canada Concussion (2016). "Association Between Early Participation in Physical Activity Following Acute Concussion and Persistent Postconcussive Symptoms in Children and Adolescents." *JAMA* 316 (23): 2504-2514.
- Institut national d'excellence en santé et en services sociaux (INESSS). Traumatologie et soins critiques. www.inesss.qc.ca.
- Maas, A. I., Menon, D. K., Adelson, P. D., Andelic, N., Bell, M. J., Belli, A., ... & Citerio, G. (2017). Traumatic brain injury: integrated approaches to improve prevention, clinical care, and research. *The Lancet Neurology*.
- McCrory, G. A., Davis, M., Putukian, J., Leddy, M., Makdissi, M., Sullivan, S.J., Broglio, S.P., Raftery, M., Schneider, K., Kissick, J., McCrea, M., Dvorak, J., Sills, A.K., Aubry, M., Engebretsen, L., Loosemore, M., Fuller, G., Kutcher, J., Ellenbogen, R., Guskiewicz, K., Patricios, J., & Herring, S. (2017). "The Sport Concussion Assessment Tool 5th Edition (SCAT5)." *British Journal of Sports Medicine*.
- McCrory, P., Meeuwisse, W.H., Dvorak, J., Aubry, M., Bailes, J., Broglio, S., Cantu, R.C., Cassidy, D., Echemendia, R.J., Castellani, R.J., Davis, G.A., Ellenbogen, R., Emery, C., Engebretsen, L., Feddermann-Demont, N., Giza, C.C., Guskiewicz, K.M., Herring, S., Iverson, G.L., Johnston, K.M., Kissick, J., Kutcher, J., Leddy, J.J., Maddocks, D., Makdissi, M., Manley, G.T., McCrea, M., Meehan, W.P., Nagahiro, S., Patricios, J., Putukian, M., Schneider, K.J., Sills, A., Tator, C.H., Turner, M., & Vos, P.E. (2017). "Consensus statement on concussion in sport-The 5th International Conference on Concussion in Sport held in Berlin, October 2016." *British Journal of Sports Medicine*.
- Pinchefskey, E., Dubrovsky, A.S., Friedman, D., Shevell, M. (2014). Part I- Evaluation of Pediatric Posttraumatic Headache. *Pediatric Neurology*. DOI: 10.1016/j.pediatrneurol.2014.10.013
- Pinchefskey, E., Dubrovsky, A.S., Friedman, D., Shevell, M. (2014). Part II- Management of Pediatric Posttraumatic Headache. *Pediatric Neurology*. DOI: 10.1016/j.pediatrneurol.2014.10.015
- Schneider, K. J., Leddy, J.J., Guskiewicz, K.M., Seifert, T., McCrea, M., Silverberg, N.D., Feddermann-Demont, N., Iverson, G.L., Hayden, A., & Makdissi, M. (2017). "Rest and treatment/rehabilitation following sport-related concussion: a systematic review." *British Journal of Sports Medicine*.
- Silverberg, N.D., Iverson, G.L. (2013). Is Rest after Concussion "the Best Medicine?": Recommendations for Activity Resumption Following Concussion in Athletes, Civilians, and Military Service Members. *Journal of Head Trauma Rehabilitation* 28(4), 250-259.
- Thurman, D. J. (2014). The Epidemiology of Traumatic Brain Injury in Children and Youths: A Review of Research Since 1990. *Journal of Child Neurology*. DOI: 10.1177/0883073814544363
- Zemek, R., Barrowman, N., Freedman, S.B., Gravel, J., Gagnon, I., McGahern, C., Aglipay, M., Sangha, G., Boutis, K., Beer, D., Craig, W., Burns, E., Farion, K. J., Mikrogianakis, A., Barlow, K., Dubrovsky, A.S., Meeuwisse, W., Gioia, G., Meehan, W.P. 3rd, Beauchamp, M.H., Kamil, Y., Grool, A.M., Hoshizaki, B., Anderson, P., Brooks, B.L., Yeates, K.O., Vassilyadi, M., Klassen, T., Keightley, M., Richer, L., DeMatteo, C., Osmond, M.H. Pediatric Emergency Research Canada Concussion (2016). Clinical Risk Score for Persistent Postconcussion Symptoms among Children with Acute Concussion in the ED. *JAMA* 315(10), 1014-1025.
- Zemek, R., Duval, S., Dematteo, C., Solomon, B., Keightley, M., Osmond, M., et al. (2014). Guidelines for Diagnosing and Managing Pediatric Concussion. Retrieved from: onf.org/documents/guidelines-diagnosing-and-managing-pediatric-concussion. (2013). SCAT3. *British Journal of Sports Medicine* 47(5), 259.

